

شرایط ترخیص:

1. اطمینان از رعایت POLICE
2. رگ با مناسب با اخذ رضایت و تعهد قانونی
3. تجویز یک دوز سزپایی همراه aryoseven 1.2 90-120ugr/kg یا FEIBA 50-75IU/kg جهت تزریق در صورت بروز خونریزی مجدد یا شروع مجدد درد (در صورت عدم پاسخ به تزریق دوز همراه بیمار باید به مرکز مراجعه کند)
4. ویزیت بعدی در صورت عود درد
5. ویزیت هفته بعد از توپیدی جهت باز کردن اتل و اتمام بی حرکتی و تعیین برنامه فیزیوتراپی در صورت لزوم

تعاریف تشدید درد:

1. اختلال در خواب (خواب نرفتن یا بیدار شدن)
2. اختلال در رفتار و کار روزانه (بازی، غذا خوردن، مدرسه رفتن و ...)
3. نیاز به مصرف مسکن بیشتر
4. حدس و تخمین پزشک درباره عدم کنترل مناسب با aryoseven 90-120ugr/kg یا FEIBA 50-75IU/kg

تعاریف پاسخ به درمان (pain score: 0-10)

- بهبود: به طور واضح نسبت به ویزیت قبلی بهتر شده
- عدم بهبود: نسبت به ویزیت قبلی تغییر واضحی نداشته
- تشدید: به طور واضح نسبت به ویزیت قبلی بدتر شده

تشدید و ملاحظات درمانی:

در صورت تشدید علائم علیرغم مداخله درمانی به جز ادامه الگوریتم با احتمال مقاومت یا عدم پاسخ به فرآورده، سایر علل از جمله ارتیت سپتیک، شکستگی و علل موضعی بروز درد باید R/O شود

ملاحظات تجویز FEIBA:

- سقف دوز روزانه 200IU/kg
- حداقل فاصله دریافتی Q6h

درمان ترکیبی:

- aryoseven 90ugr/kg Q6h (3-9-15-21)
- FEIBA 50IU/kg Q6h (0-6-12-18)

دوز همراه سرپایی:

- در بیماران دارای مهار کننده 6 دوز 90-120 آریوسون یا دو دوز FEIBA 100-75IU/kg
- در بیماران دریافت کننده هملیپرا سه دوز 90-120 آریوسون